

Záznamová karta pre pacienta užívajúceho warfarín sodný

30 kusov

Roche Slovensko, spol. s r.o.

Diagnostics Division

Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1

tel.: 02/5710 3694

www.coagucheck.sk

Orion Oyj, organizační složka

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 2

tel.: 02/5022 1215

www.warfarin.sk

Skrátená informácia o prípravku

Zloženie: Warfarinum natricum 3 mg alebo 5 mg v 1 tablete.

Indikácie: profylaxia a liečba tromboembolických stavov, riziko embolizácie pri fibrilácii siení, akútny IM, riziko embolizácie po implantácii chlopňovej náhrady, recidivujúce povrchové tromboflebitídy.

Kontraindikácie: precitlivosť na zložky prípravku, ťarchavosť, krvácavé stavy, ťažké poškodenie pečenejých a obličkových funkcií, neliečená alebo nekontrolovaná ťažká hypertenzia, nedávne vnútrolebečné krvácanie, predispozícia k vnútrolebečnému krvácaniu, operácie CNS alebo očí, predispozícia ku krvácaniu gastrointestinálneho traktu alebo močových ciest, infekčná endokarditída alebo krvácanie do osrdcovníka, demencia, psychózy, alkoholizmus.

Balenie: 100 tabliet.

Dávkovanie a spôsob podania: dávkovanie individuálne podľa protrombínového času. V prvých 2 - 4 dňoch sa podáva vyššia dávka (najčastejšie 8 - 10 mg warfarínu), ktorá sa spravidla znižuje podľa dosiahnutých hodnôt INR. Optimálne hodnoty INR sa pohybujú podľa závažnosti v rozsahu 2,0 - 3,5. Ukončenie liečby musí byť postupné kvôli možnému riziku trombotických komplikácií.

Držiteľ registračného rozhodnutia:

Orion Corporation, P.O. Box 65, 02101 Espoo, Finsko.

Časté a závažné liekové interakcie:

Účinok warfarínu zvyšujú: ssalicyláty, kotrimoxazol, metronidazol, erytromycín a niektoré ďalšie makrolidy, doxycyklín, niektoré sulfónamidy, flukonazol, itrakonazol, mikonazol, ďalšie imidazolové antimykotiká, amiodarón, propafenón, chinidín, sotalol, sulfipyrazón, disulfiram, fenylobutazón, ostatné tertracyklíny, chloramfenikol, nidrazid, chinolóny, cefotetán, cefamandol, latamoxef, cefoperazón, vysoké dávky PNC, piroxikam, alopurinol, benzbromarón, anaboliká, danazol, tamoxifén, statíny, fibráty, 5 - fluorouracil, tyroxín.

Účinok warfarínu zoslabujú: vitamín K, koenzým Q10 (ubidekarenón), barbituráty, rifampicín, rifabutín, karbamazepín, nafcílín, dikloxacilín, grizeofulvín, cholestyramín, chlórdiazepoxid, glutetimid, metformín, diuretiká, colestipol, rioprostil, vitamín E, antacída, sukralfát. Účinok warfarínu sa znižuje požívaním veľkého množstva potravín bohatých na vitamín K.

Pri predávkovaní: podať vitamín K perorálne alebo parenterálne, čerstvú krv, mrazenú plazmu, koagulačné faktory. Nežiaduce účinky: krvácavé stavy, nauzea, zvracanie a hnačka. Prípravok je dostupný na lekárske predpis v lekárni, o podmienkach úhrady Vám informácie poskytnú zástupcovia spoločnosti Orion Pharma.

Nežádoucí účinky: krvácavé stavy, nauzea, zvracanie a príjem. K dispozícii v lekárnach na lekárske predpis, hrazen z prostredku verejného zdravotného pojištenia.

Registračné číslo: 16/0011/89 - S.

Dátum ostatnej revízie textu: 1.12.2002

WARFARIN ORION

warfarinum natricum 3 mg alebo 5 mg v 100 tabletovom balení

**ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA
S TRADÍCIOU A SPOĽAHLIVÝM
MONITORINGOM INR**



Roche

www.coagucheck.sk

ORION
PHARMA

www.warfarin.sk

Dátum	INR	Týždenná dávka mg	Po	Ut	St	Štv	Pia	So	Ne	Dátum ďalšej kontroly

Záznamová karta pre pacienta užívajúceho warfarín sodný

Meno a priezvisko:	
Diagnóza:	
Terapeutické rozpätie INR:	
Medikamentózna liečba je plánovaná:	
Iná liečba ovplyvňujúca terapiu warfarínom sodným:	
Riziko TEN:	Krvná skupina:

Váš lekár:

Priestor pre pežiatku:

Ordinačné hodiny:

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Tento materiál je pre pacientov zadarmo.

Dátum	INR	Týždenná dávka mg	Po	Ut	St	Štv	Pia	So	Ne	Dátum ďalšej kontroly